


Risso's dolphin | Rundkopf-Delphin

## Calderón gris



### Biología y ecología

Es una especie oceánica, que prefiere las aguas profundas, aunque puede aparecer cerca de la costa, en zonas con plataforma estrecha y en torno a islas oceánicas, como en el caso de Canarias. En invierno y en primavera, es frecuente encontrarlo cerca de la costa.


Las cicatrices corresponden a las mordidas de otros calderones grises así como a los encuentros con los cefalópodos, de los que se alimenta. En ocasiones, puede aparecer junto a grupos de otros cetáceos, como delfines y otras especies de calderones.

### Curiosidades

En Canarias, es la especie que, junto con el delfín mular, más se acerca al litoral. Se localiza, sobre todo, en costas del noreste de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife.

Es frecuente observarlo semi-sumergido, en posición vertical, con la aleta caudal fuera del agua.

Las cicatrices sobre el cuerpo aumentan con la edad y son el resultado de luchas, tanto con sus congéneres, como con calamares de grandes dimensiones.



#### ESTACIONALIDAD (meses)



#### DISTRIBUCIÓN EN CANARIAS



#### DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

Aguas tropicales, subtropicales y templadas de todos los océanos.



■ **Protección en Canarias:** Vulnerable

■ **Amenazas:** Artes de pesca no selectivas, navegación, contaminación e industria ballenera

■ **Longitud máx.:** 3,8 m

■ **Peso máx.:** 600 kg